

醫學正傳卷之七 目錄

○婦人科

經候 上

論

脈法

丹溪方法 九三十三條

同經丸

崩漏因氣所使方

崩漏有虛有熱

加味四物止血方

帶下是溫熱爲病

婦人病宜用當歸說

結瘕帶下小腹丹

肥人帶下溫痰方

治帶黃荆子方

治白帶方

又治白帶方

帶下必須斷厚味

一人頭風帶下方

東垣治帶主寒

赤白葵花治帶說

調經升陽除溫湯

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

固真丸


鳥藥湯

助陽湯

丁公膠艾湯

火丹

黃芪當歸入參湯



當歸芍藥湯
升陽舉經湯
柴胡丁香湯
人參補氣湯
補經固真湯
四聖散
通經下取方
加減四物湯
香附一物丸
益母丸
祖傳通經秘方
又補傳血崩方
○婦人科 中胎前論
附期嗣法
脉法

柴胡調經湯
當歸附子湯
延胡苦練湯
黃芪白朮湯
溫胃補血湯
溫經除濕湯
元戎加味四物湯
通經丸
艾附丸
苦練丸
又月經不通方
已試醫驗一條
地黃通經丸
丹溪活套
祖傳血崩方
桃仁散
膠艾湯

丹溪方法 凡四條
安胎丸
懷孕嗜物說
又胎漏方
心腹諸痛
心腹諸痛
妊娠腰脚腫痛方
半夏茯苓湯
小膠艾湯
妊娠下血如月信來方
胎動衝心煩悶方
妊娠遺尿失禁方
治子煩犀角散
治子煩竹瀝湯
治子煩當歸飲
固胎飲
又丹溪方法 凡三條
胎動說
又胎漏方
又妊娠心腹疼痛方
川芎散
孕婦嘔吐醫按
胎腫方
又膠艾湯
妊娠腰痛如折方
妊娠腰痛如折方
惡阻方
參橘散
妊娠下血不止方
胎孕無故下血方
妊娠因舉重仆跌方
子煩方

產寶澤鴻散

張仲景方法

木通散

金生白朮散

鯉魚湯

紫蘇飲

天仙藤散

安榮散

地膚子湯

治子淋散

冬葵子散

車前散

忘憂散

葛根湯

防已湯

消風散

天門冬散

百合散

緩息丹

八味丸

丹溪參术飲

丹溪轉胞論

安胎散

如聖散

羚羊角散

苧根湯

桑寄生散

芳蕎補中湯

歸涼節命散

白扁豆散

妊娠泄鴻方

當歸芍藥湯

升麻六物湯

催生散

傷寒安胎方

又妊娠傷寒方

小產下血不止方

妊娠咳嗽方

妊娠嗽紅瘀方

安榮湯

小產後心腹痛方

兒在腹中叫哭方

又治鳴胎方

丹溪東胎丸

丹溪達生散

臨月養胎方

催生散

紅蕎馬齒墮胎說

難產多是氣血虛說

金匱當歸散

又難產多見於安逸說

如神丹

金液丸

催生鉛丹

來甦散

麝靈奪命丹

無憂散

催生奪命如神丹

孝歸湯

奪命丹

藥石禁

胞衣不下方


枳殼散

難產說

飲食禁忌篇

炙難產法

臨產湏知條十九
橫倒產法



又治橫生方

又橫逆不順方

礙產說

兒身向未順說

治盤腸產法

子死腹中方

下死胎牛膝丸

子死腹中不出方

又治子死腹中方

生子下血過多方

胞衣不下方

丹溪活套

祖傳經驗祕方

又祖傳催生驗方

脉法

祖傳治胞衣不下三退散

嚴氏清竈散

愈風湯

丹溪方法條一十

產後乳汁不通方

產後泄瀉痢方

新產不可用芍藥

產婦損破尿脬

黑神散

丹溪小水短少說

當歸黃芪湯

失笑散

人參當歸散

抵聖散

當歸羊肉湯

增損四物湯

當歸散

黃芪湯

三聖散

四物一黃散

烏金散

柏子仁散

調經散

正脾散

七珍散

琥珀散

交感地黃煎丸

麻仁丸

調中湯

定痛散

固經丸

熟乾地黃丸

滋腸五仁丸

八味理中丸

旋覆花湯

拒勝湯

當歸養血丸

猪腎子飲

四神散

當歸養血丸

桃仁膏

硫黃湯


當歸散

漏芦湯

母猪蹄湯

乳汁不通方

丹溪活套



新編醫學正傳卷之七

花溪恒德老人虞搏天庚編集

姪孫虞守愚惟明校正

金陵三山街書坊松亭吳江繡梓

婦人科 上月經

論內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息奔者死不治難經曰心出血肝納血肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而燔若夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母能念子虛是以脾不磨而食亦少所謂二陽之病發心脾者火也二陽者因食少故肺金亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既之則經血日以乾涸以致或先或后淋瀝無時



若不早治漸而至於閉塞不通甚則爲癥瘕血膈勞極之証不易治也又如崩漏不止之証先因心火亢甚於是血脉浸溢以致肝實而不納血出納之道遂廢經曰子能令母實是以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而泛溢也若不早治漸而至於崩中不息甚則化爲白濁白淫血枯發熱勞極之証不可治矣經曰邪氣盛則實正氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火亢甚者邪氣盛也邪氣者丹溪曰天非炎火不能生物人非炎火不能有生但貴乎適中凡動必聽命乎心君則無已上諸証太抵經閉不行與夫經漏不止其初皆由心事不足以致月經不行早不調治直至危篤求醫雖妙手莫能爲矣東垣經閉不行有三論崩漏不止亦有三論學者宜叅究其論以治之不可拘泥也


脉法

○脉經曰寸口脉微而濶微則衛氣不足濶則榮氣無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言吾謬誤趺陽脉微而濶則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣濶則失液少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濶則血不來以爲居經三月二來

○脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可不者以爲居經三月二來

○脉微弱而澁年少得之爲無子中年得之爲絕產

○寸口脉沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏趺陽脉伏水穀不化脾氣衰則脹滿胃氣衰則身體腫少陽脉卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血不利則爲水名曰水分



○寸口脉沉而數數則爲出沉則爲入出則爲陽實入則爲陰
結趺陽脉微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脉沉而
滑沉則爲在裏滑則爲實沉滑相搏血結胞門其藏不瀉
經絡不通名曰血分○經水前斷後病水名曰血分此病
難治先病水後經斷名曰水分此病易治

○婦人帶下六極之病脉浮則爲腸鳴腹滿緊則爲腹中痛數
則爲陰中痺痛則生瘡弦則陰戶掣痛

○婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

○婦人寸口脉浮而弱浮則爲虛弱則爲血滯則短氣弱則有
一熱而自汗出

○趺陽脉浮而濇浮則氣滿濇則有寒喜噫吞酸其氣時下小
腹則寒

○少陰脉滑而數者陰中生瘡

○少陰脉弦者白勝必挺核

○少陰脉浮而動浮則爲虛動則爲痛婦人則脫下

○婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生

○婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者死

○婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死

○少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡
寒絕產

○肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胸上有寒

○婦人月經一月再來者經來其脉欲自止常而反微不利不
汗出者其經二月必來

方法丹溪方法凡

丹溪曰經候有枯閑不通者有不及期與過期者有妄行者

有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因癆疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

○虛中無熱月事不來以

四物湯加黃芩治之

○常過期者血少也以

芍歸參术兼痰藥治之

○過期紫黑有塊作痛血熱也以

四物湯加香附黃連

○過期色淡挾痰者以

二陳湯加芍歸

○常不及期者血熱也以

四物湯加黃芩黃蓮香附肥人多兼痰藥治之

○血枯經閉者以

四物湯加紅花桃仁

○瘀多佔往血海地位因而下多者目必漸昏肥人多有之以

南星蒼朮川芎香附作丸服之

○肥人軀脂滿經閉者以


導痰湯如芍歸黃蓮不可服地黃泥疾故也如用必以姜

汁炒肥人少子亦由痰多脂膜閉塞于宮不能受精而施化也宜服上藥

○瘦人子官無血精氣不聚亦令無孕以

四物湯養益養陰等藥

○經水未行臨經將來作疼者血實也一曰瘀血鬱滯也以



四物湯加茺仁香附黃連紅花或加玄胡索莪术木香有熟加柴胡黃芩

○經水行後而作寒者血俱虛也以八物湯加減煎服

○夫血爲氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚也今人悉指爲風冷而行溫熱之劑禍不旋踵

○調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來皆可服

川歸酒洗一錢半夏湯炮七錢白芍藥一錢川芎一錢牡丹皮去心肉桂五分阿膠珠各七分半人參去芦一錢

右細切作二服水二盞加生姜三片煎至一盞空心稍熱服

○月經過期不行宜服

當歸一錢川芎五分熟地黃一錢白芍藥一錢赤仁二十箇紅花三分香附米一錢熟桂五分

蓬莪术一錢甘草五分蘇木一錢

木通八分

右細切作二服水一盞半煎至一盞空心溫服

○月經先期而來宜服

歸身一錢半川芎半錢白芍藥八分生地黃一錢

阿膠珠半錢

艾葉半錢

條芩一錢

甘草半錢

香附一錢黃柏半錢

知母半錢

黃連姜汁炮炒八分

右細切作二服水煎空心服

○經不通用馬鞭草杵汁敷膏爲丸或燒存性爲丸紅花當歸

煎湯送下

○固經丸治經水過多不正

黃芩

龜板

白芍藥

一錢

樗根白皮

七分

黃柏

炒

三錢

香附

童便浸

一宿

培乾

二錢半

○崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急則治其標用白芷湯調下百草霜服或棕櫚灰或狗頭骨燒存性或伍靈脂半生半炒俱以酒調服後以四物湯加乾姜調補之緩則治其本四物湯加芩蓮參芪香附乾薑之類

○四物湯加荆芥穗條芩止血神妙

○崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑歸身一錢白芍藥一錢酒炒熟地黃丁錢川芎黃芪蒲黃地榆人參各半錢白朮一錢升麻三分煎服甚者加棕櫚灰爲末酒調服

○婦人血病宜用當歸若肥白人與入參黃芪同用瘦黑人宜與生地黃香附同用

○帶下是濕熱爲病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼朮治濕爲主氣虛入參术血虛入芎歸

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知以二陳湯加蒼朮升麻柴胡甚者上用吐法以提其氣下用二

陳加二术仍用瓦壘子以燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃柏蒼朮川芎香附樗皮冬加乾薑瘦人少有此病有者是熱以滑石樗皮川芎海石青黛丸服

○結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以補藥調治一方治白帶

樗白皮

山茱萸

苦參

香附各伍錢



卷之十七

七

龜板 酒炙

枳子 各二兩 黃柏 一兩 乾姜

貝母 各二錢半

白芍藥 七錢半

右爲細末酒糊爲丸服

○又方

白芷

四兩以石灰半斤淹三宿瀝去灰以白芷炒焦爲末清米飲調空心服之

○又方以黃荆子一味炒焦爲末米飲調服上可治心漏下可治白帶以其能燥溫痰也

○羅先生治帶用十棗湯神祐丸玉燭散此法實者可用虛者不可峻攻

○帶下必湏斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應用之

○一人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮黃芩辛夷川芎

黃柏

炒焦滑石半夏牡礪粉丸服

肥溼泄○四物湯乃婦人衆疾之總司也

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

右細切等分水煎服

○東垣治崩漏帶下多主於寒學者宜再思之不可一途而論經曰陰虛陽搏謂之崩漏此可知

○東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

○東垣調經升陽除溫湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因飲酒不節勞倦所傷或素有心氣不足致令怒火乘脾必急憤嗜臥困倦乏力氣短氣急脾主濕榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不上伸以勝其溫又云火鬱則發之

當歸酒洗

獨活各五分

蔓荆子七分

防風

炙甘草

升麻

藁本各一錢

柴胡

右與前四味同研爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心淡醋湯送下忌油膩冷物及酒濕麯等。

○固真丸治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦痛目中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒濕乘於胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也法當

大瀉寒湿以丸治之

黃柏酒洗白芍藥各五分

柴胡

白石脂

各一錢火煅研爲末

白龍骨酒煮水飛

當歸

酒洗

各一錢

乾姜

四錢炮

右除龍骨石脂水飛日乾另研外餘共爲細末麵糊爲丸如雞頭仁大曰乾空心白湯下少時以早飯壓之是不令

熱藥犯胃也忌生冷硬物酒溫薦

陳○烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸一錢

甘草

木香

各五

烏藥

一錢半

香附子二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○助陽湯治白帶下陰戶中痛空心面急痛身黃皮緩身重

如山陰寒如冰

生黃芩

橘紅各五分

防風

高良姜

乾姜

郁李仁

當歸

錢

柴胡一錢三分

白葵花分

服

右細切分作二服每服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱

服

○丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所
得其脉兩尺俱弦緊洪按之無力自覺臍下如冰冷白帶
及白滑之物多間有如屋漏水下時或有鮮血右尺脉時
或浮洪

熟地黃

白芍藥各三

川芎

丁香各四分

阿膠珠六分

生艾葉一錢

當歸二分

右以川芎地黃丁香另爲細末其當歸芍藥艾葉各細切連煎共六味入水五大盞煎至三盞半去粗入阿膠再上火煎至一大盞稍熱空心服

○水府丹治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹中暴痛面有黑黯黎黑羸瘦

硝砂紙隔沸湯

木香

乾姜各一

紅豆五錢桂心另為末

砂仁二兩

花蕊石兩半煅研一

班貓一百箇生地黃汁

童子尿各一

臘月狗膽七枚

元精米同炒黃色去米

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如鷄頭寶大碌砂爲丸每服一丸食前細嚼溫酒送下米飲亦可

垣東

○黃芪當歸人參湯治婦人經水暴崩不止先因損傷失血自後一次縮一十日而來其後暴崩不止蓋因其人心窄性急多驚而心氣不足及飲食不節得之診得掌中寒脈沉細而緩帶數九竅不利四肢無力上喘氣促口鼻氣不下氣大便難宜先治其本餘証可妄安心定志和脾胃益元氣補血養神以大熱劑去其寒少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱

黃連二分

生地黃三分

炒神廸

橘紅

桂枝各五

草荳蔻六分

黃芪


人參

麻黃不去節各一錢

當歸身一錢

杏仁五枚另研如泥

右細切作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去沫煎至二盞下諸藥同煎至三盞食前服立止又以草荳蔻丸五十



九以止胃脘客寒之痛，再與肝積之藥除其病根。

東垣○當歸芍藥湯治婦人經水漏下不止，其色鮮紅，時值炎月，先因勞役脾胃虛弱，氣短氣逆，自汗不止，身熱悶亂，不思飲食，四肢困倦，大便時泄後復因心氣不足，經水暴下，不

正微覺氣下行，氣逆氣短，懶於語言。此藥主之。

柴胡二分

炙甘草

生地黃各三分

黃芪一升

陳皮去白

熟地黃各五分

蒼朮米泔浸

白朮

川歸

白芍藥錢半

右細切作二服水二盞煎至一盞空心溫服。

東垣

○柴胡調經湯治經水不止，其色鮮紅，項筋急，腦痛，脊骨強痛。

炙甘草

當歸身

葛根各三分

獨活

藁本

升麻各五分

柴胡七分

羌活

蒼朮錢一

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服，取微汗立止。

東垣

○益胃升陽湯治婦人經候凝結，黑血成塊，左廻有血瘕，水泄不止，食有時化，後血塊暴下，并水泄俱作，是前後二陰有形，血脫竭於下，既久經候猶不調水泄，日三四行食罷，煩心，飲食減少，人形瘦弱，益脫益氣，古聖人之法也，先補胃氣以助生發之氣，故曰陽生陰長，諸卦藥爲之先務。

蓋其能生益陽，生陰長之理也，人身以穀氣爲宗，故先理胃，氣爲要。

柴胡

升麻各五分

炙甘草

當歸身酒洗

陳皮錢一

人參不用


炒神曲各錢二分

黃芪一錢半

白朮二錢

生黃芩二分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服，如腹中



痛加白芍藥三分，中桂少許。○如渴或口乾加葛根三分，不拘時服。

垣○升陽舉經湯治經水不止右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒之証輕者其脉數疾舉指弦緊或溢皆陽脫之証陰火亦亡見熱証於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先去也當溫之舉之升之淨之燥之此法乃大升浮血氣補命門之下脫。

肉桂夏月不用 白芍藥各二 紅花半分 細辛三分
人參 熟地黃 川芎各半分 獨活根

黑附子炮 炙甘草各七 兼活

藁本

防風各一錢 白术

當歸

黃芪

柴胡各一錢 桃仁泥少許

右細切分作三服每服用水二盞煎至一盞空心熱服。

垣○當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

當歸四分 炒鹽三分 蠍稍 升麻各五分

甘草炙六分 柴胡七分 黃柏少許

附子炮一兩

乾姜炮

良姜各八分

酒麯糊為丸亦可

右細切作丁服水三盞煎至一盞去粗稍熱服或爲細末酒麯糊為丸亦可

防風

蒼朮各二分 麻黃不去節 炙甘草

人參去芦

當歸身

白术

生黃芩

升麻各五分

黃芪七分

良姜

澤瀉


羌活各一錢

柴胡四分

杏仁研末

桂枝少許

白葵花去萼



右細切作一服除黃芩麻黃另外先以水三大盞煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

東垣○柴胡丁香湯治婦人年三十歲左右臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三二日

生地黃五分

丁香四分

當歸身

防風

羌活各一錢

柴胡二分

全蝎一枚

右細切作二服水二盞煎至一盞去粗食前稍執服之

東垣○延胡苦練湯治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃柏一分

延胡索

苦練子各二分

附子炮

肉桂各三分

炙甘草五分

執地黃一枚

右細切作二服水二盞煎至一盞食前溫服

東垣○桂附湯治白帶腥臭多悲不樂太寒誕

黃柏為引用知母各五分肉桂五分

附子炮三分

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服如少食常飽腹中滿悶加白芍藥五分○如不思飲食加五味子二十箇○如煩惱面上如虫行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢半人參七分炙甘草升麻各五分

東垣○人參補氣湯治四肢懶倦自汗無力

丁香末二分生甘草

炙甘草各三分

生地黃

白芍藥各五分黃柏七分

熟地黃六分

人參去芦

防風去芦羌活

知母

當歸身

升麻各七分柴胡一錢


黃芪一錢半

全蝎一箇

五味子箇二十

右細切作三服水二大盞煎至一盞空心稍熱服

東垣○黃芪白朮湯治婦人四肢沉重自汗上至頭頸惡風頭痛



痘瘡方

卷之十

十一

燥熱方

細辛二分

吳茱萸

川芎各三

柴胡

升麻各四分

當歸六分

黃柏酒炒

羌活各八分

五味子一錢

白朮

人參各一錢半

黃芪二錢半

右細切作一服水二大盞生姜五片煎至一盞去粗食前
稍熱服

東垣○增味四物湯治婦人血積血瘕

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

京三稜

乾漆另研炒烟盡肉桂皮去龐

廣茂各等分

東垣○補經固真湯治婦人白帶下流不止其心胞尺脉微細
始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止所

謂崩中日久爲白帶也乃本經血海枯竭津液復亡不能
滋養筋骨以本部行經藥爲引用以大辛甘油膩之藥潤
其枯而滋津液以大辛執之藥補其陽道生其血脉以苦
寒之藥泄其肺而救上執傷氣以入參補之以微苦溫之
藥爲佐而益元氣

白葵花研爛

陳皮五分不

生黃芩另入細研去皮炙

炙甘草


柴胡錢各一

乾姜細末

人參二錢

右細切除黃芩外以水二盞煎至一盞半入黃芩同煎至
一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之

○溫胃補血湯治婦人耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味胃氣不
和四肢困倦行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉
中吟吟不得卧口燥咽乾太息頭不可以回顧項筋緊急
脊骨強痛頭旋眼黑頭痛噴嚏



生地黃

白朮

藿香

黃柏各二分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

陳皮

吳茱萸各三錢

當歸身四分

柴胡

入參

炙甘草

地骨皮各五錢

升麻

生甘草各六分

黃芪一錢

丁香一箇

桃仁參箇

白葵花

立効散治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花各一兩

右剉如豆大

白朮包裏泥固火煅存性

為細末每服三錢

○如乾血氣研血竭

為引溫酒調服或加輕粉五分如血

崩甚不止加射香為引溫酒調服

○四聖散治婦人赤白帶下

川烏炮

生白礬各一錢

紅娘子三箇

班貓十箇

右爲細末練蜜為丸如皂子大綿裹塞陰戶中

溫經除湿湯治婦人值冬月四肢無力乃痿厥

濕熱在下焦

也齶心者是濁氣不下降欲爲中滿也合眼

麻木作者陽

道不行也惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也開目不

陷於血分不得伸越而作也近火則有之

黃連二分

柴胡

草豆蔻

神曲

木香各三分

麻黃根節

當歸身

獨活

黃柏

升麻

羌活各五分

炙甘草

人參

白朮

陳皮

蒼朮各一錢

澤瀉各七分

黃芪

右細切作一服水

二大盞煎至二盞食遠服治肢節疼痛

止

無勞之勝藥也

產

○癰仁散治婦人月水不調或淋瀝不斷後復來狀如瀉水虛弱不進飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來身體沉重惟欲眠卧多思酸物

癰仁去皮尖炒研各一

半夏各三分

赤芍

生地黃錢各一

澤蘭葉

川牛膝

桂心

牡丹皮

人參

當歸

蒲黃

川芎各七分

產

○通經下取方曾經試驗神効

海蛤粉五錢

苦葶藶

牙皂錢各二半

巴豆畧去油

天花粉

苦丁香

紅娘子錢各一分

射香

右為細末每用一錢葱涎同搗爲丸薄綿裹以五寸竹管

產

○通經丸治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

桂心

青皮

大黃

酒濕研

川椒

莪朮

乾姜

川烏

炮去皮

乾漆

碎炒烟盡

當歸

癰仁

如泥各等分去皮尖炒研

右為細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥末成劑白中杵勻丸如梧桐子大每服二十丸空心淡醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可下性畏寒者入雞子清和藥內

良

○膠艾湯治勞傷氣血衝住虛損月水過多淋瀝不止

阿膠炒成珠

川芎

甘草

炙各五分

當歸

艾葉各七分半


熟地黃

白芍錢各一

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○一方加地榆

黃芪見胎前門



良方○加減四物湯治經候微少漸至不通手足煩疼形瘦潮熱

脉息微數次

本方去地黃川芎加澤蘭葉二倍甘草半分如經候過多
本方去熟地黃加生地黃如經行身熱脈數頭昏本方加
柴胡黃芩如經行微少或脹或痛四肢疼痛本方加延胡
索沒藥白芷共為末以淡醋湯調下如經候不調心腹疼痛
只用芍藥二味煎服名君臣散以歸倍於芎也

○元戎加味四物湯因氣衝經脈故月事頻併脣下多痛本方
加白芍藥○如經欲行脣腹病痛本方加玄胡苦練枳郎
木香○如經水過多本方加黃芩白朮○如經水澀少本
方加葵花紅花○如經水適來適斷或伴來寒熱宜先服
小柴胡湯以去寒熱然後以四物湯和之或以二方併服
名柴胡四物湯

產○香附一物丸治經候不調血氣刺痛腹脇彭脹頭眩惡心

崩漏帶下並宜治之

香附子杵去皮毛不拘多少米醋浸一日夜用瓦瓶煮令熟焙乾

右為細末醋糊為丸如梧桐子大日乾每服五十丸淡醋

湯下

產○艾附丸治証如前

香附子一片醋煮艾葉四兩

當歸二兩

右為細末醋糊為丸服

產○地黃通經丸治婦人經候不行結成血瘕在膚下如覆杯

熟地黃三兩

蟲虫去頭足炒


水蛭炒去沫

桃仁各五箇

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒

下未知加至七八十九

良方○益母丸治婦人赤白帶惡露時下不止及治婦人胎前產



後及經中諸般奇病無所不療。

益母草

一名茺蔚子紫花方莖俗名野天麻五月採陰乾一丸用熟酒加童便化下兼氣者亦香湯化下或只以末子每服二錢或酒或童便調下此婦人之聖藥也

○苦練丸治赤白帶下最妙

苦練

碎酒浸

茴香炒

當歸各等分


右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下

丹溪活套曰

凡婦人經候不調皆當以四物湯爲主治○如經候過而腹中作痛綿綿無休息者屬血虛本方倍當歸熟地黃兼氣虛者本方加入參芪挾寒者加乾姜○如經候將來腹中陣陣痛乍作乍止者血氣實也本方用生地黃加黃連香附赤仁紅花玄胡索牡丹皮之類○如經水常不及期而行者益

熱也本方用生地黃加黃連黃芩白芷之類○如經水常過期而來者瘦人多應是血少本方倍當歸熟地黃加黃芪甘草少佐以紅花赤仁況以爲生血之引用也○肥人太熙是氣虛挾瘀阻滯升降然地黃方去地黃加參芪甘草茯苓半夏陳皮香附等藥○常過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛本方用生地黃加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥之類○過期而血淡色者瘀多血少也本方用生地黃合二陳湯煎服○肥盛婦人或三二箇月一行者瘀盛而軀脂閉塞經脉以導瘀湯加芎歸香附蒼白木之類○如經水適來適斷往來寒熱如瘡者本方合小柴胡前服○如經行過三五日腹中綿綿走痛者坐血行而滯氣未盡行也本方加木香換擗煎服立愈

○祖傳經驗秘方治婦人室女月經不通漸成脹滿及治男子



墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成血蠱病者悉皆治之名曰癩奴飲子

癩奴

癩樹上嫩芽乾枯不落者冬月及正月採假鼠糞即堆鼠糞也

玄胡索

肉桂

香附米

五靈脂犯肚

砂仁

杏仁

去皮尖另研

右各等分爲細末每服三錢空心溫酒調下

○一方治月經不通只以鼠糞一合畧炒研細溫酒調下立效

○又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調服立止或調入四物湯中亦効

○一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効予以橡斗蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芷茅花乾姜煎湯調服


其經血自此而止再不行矣

論

婦人科

中胎前

內經曰陰搏陽別謂之有孚謂陰脉搏乎其是爲血氣和平陽施而陰化也蓋爲入之夫婦猶天地然天地之道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生是故欲求嗣者先須調其婦之經脉經脉既調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂乎有孚矣脉經曰診其手少陰之脉動甚者姪子也蓋手少陰心脉也心主血脉故也又腎爲胞門子戶尺中腎脉按之不絕當姪子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之六月足陽明脈養之七月足太陽脈養之八月手陽明脈養之九月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脉各養三十日也若失至期當




養之經虛實不調則胎孕為乏不妥甚則下血而墮矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固無胎墮之患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之機要曰治胎產之病當從厥陰經論之母犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者如傷寒下早之証利大便者則脉數已動于脾利小便者則內亡津液胃中枯燥制方之法能不犯三禁則崇衛自和而寒熱止矣皆醫者之繩墨也其為妊娠之婦早當絕去嗜慾安養胎元性宜靜而不宜躁体宜動而不宜分昧宜涼而不宜熱衣宜溫而不宜寒母久立母久坐母久行母久臥又宜却去一切肥甘煎燂油膩辛辣酸水菓魚鱉狐兔鵠雀之類即無胎漏

胎痛胎動下血子腫子癟等証及橫產逆生胎死腹中之患矣丹溪曰難產之婦皆是八九箇月內不能謹慎以致氣血虛故也傳曰古者婦人妊育寢不側坐不偏立不蹲不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲口不出噦言夜則令瞽誦詩道正事則生子形容端正才過入矣古所謂胎教也妊娠之婦可不慎歟

△附期嗣論

夫人欲求嗣必先視其婦之經脈調否其感未調必以藥而調之經脈既調宜以人事副之按其法而行之庶不失其候也訣云三十時中兩日半二十八九君湏笄落紅滿地是佳期金水遇時空霍亂之時枉費工樹頭樹底覓殘紅但解開花能結子何愁丹桂不成叢以蓋婦入月經方絕金水絕生矣時子宮正開乃受精結胎之候妙合大和之時過此




佳期則子宮閉而不受胎矣然男女之分各有要妙存焉如月候方絕一日三日五日交會者成男二日四日六日交會者成女過此則不孕矣又曰陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開裏精陰外陽內則成坎卦之象而為男若陽精先入陰血後參橫氣來助精開裏血陰內陽外則成離卦之象而為女若胎成三月之內男女未分之時亦有轉女為男之術其法以鐵斧一柄置於妊娠床席之下勿令入見知更佩雄黃一二兩於孕婦身左或佩萱花亦可已上三法皆驗不可輕忽傳曰不孝有三無後為大古詩云無官一身輕有子萬事足誠哉是言也無嗣者宜深思之無怠

脉法

脉經曰婦人三部脉浮沉正等按之無絶者妊娠也○妊娠初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也○脉滑疾重以

手按之散者胎已三月也脉重手按之不散但疾不滑者五月也○妊娠四月脉左疾為男右疾為女俱疾為生二子○又法得太陰脉為男得太陽脉為女○又法左手沉實為男右手浮大為女左手俱沉實猥生二男左右手俱浮大猥生二女○又法天脉左偏大為男右偏大為女左右手俱大生二男大者如實伏○又法左右尺俱浮當作沉為生二男不爾則女作男生左右尺俱沉浮當作為產二女不爾則男作女生也此男女並形之說也

○婦人懷孕脉離經而浮設腹痛引腰脊為欲生也○又法婦人欲生其脉離經半夜覺日中即生也○懷娠六七月脉實大牢強弦緊者生沉細者死○懷娠至六七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也○寸口脉洪而濇洪則為氣濇則為血氣動丹田其形則溫濇在



於下胎冷若冰陽氣胎活陰氣必終洪則為氣者生，欲別
陰則為血者死。胎問，婦人雙
胎其一獨死其一獨生醫薦為下其死者其病則愈然後竟
免驅其脉何以別之師曰寸口脈衛氣平調榮氣緩舒陽
施陰化精盛有餘陰陽俱盛故知雙軀今少陰微緊血則
濁凝經養不周胎則偏夭小腹冷滿腰腹疼痛腰重起難
此為血理若不後早去害每失胎○婦人經自斷而有驅其
脉反弦恐其后必大下謂大下不威胎也謂大下

方法

丹溪方法

丹溪曰婦人無子者多由血少不能得精俗醫悉謂子宮虛
冷投以辛熱之藥一本有蒼术煎熬臟府血氣沸騰禍不旋踵或服艾者
不知艾性至熱入火炎則下行入藥服則上行多服則致毒
咎將誰挽孰幸

○瘦怯婦人子宮乾澀宜滋陰養血四物加香附黃芩之類肥
盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行溫燥瘀南星半夏川芎滑
石防風羌活一本有蒼术或導痰湯之類

○墮胎乃血氣虛損不能保養胎元而自墮耳猶枝枯則果落
榦萎則花墜也又因恚怒傷精內火便動亦能墮胎猶風撼
其木入折其枝也火能銷物造化自然病源乃謂風冷傷於
子臟未得病情者也大抵屬虛屬熱二者又當視其輕重而
治之

○一婦有胎即墮其脉左大無方重取則濇乃血少也以其少
年只補中氣使血自榮濃煎白朮湯調黃芩末一錢服之
至三四兩得保全而生


○固胎飲

熟地黃

歸身尾

人參

白芍藥



白术

川芎

陳皮

甘草

桑樹上羊兒藤七乘圓者

愚恐當作如檢桑葉圓者即俗名桑絡也真桑奇生尤妙少加黃連黃柏入糯米五十七粒煎服血虛不安者加阿膠珠胎氣痛者加宿砂

○安胎飲孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食不美宜服或至五六箇月常服數貼甚好

白术

川芎

條芩炒各等分

甘草

砂仁

紫蘇各三分

人參

熟地黃各一錢

當歸

白芍藥

安胎丸

熟地黃各五分

白术

條芩

神曲炒各等分

右爲細末

砂仁丸

每服五十丸

清米湯下蓋白术條芩乃安胎丸

胎之聖藥也

○丹溪曰不行不息所以生生而無窮荒蔚子活血行氣有補陰之妙命名益母以其行串有補也故曰胎前無滯產後無虛○條芩白术乃安胎之聖藥俗以黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養益使血循經而不妄行乃能養胎黃芩必取細搗沉實者用之○縮砂安胎以其止痛行氣故也砂仁非八九箇月內不宜多用懷妊嗜物乃一歲之虛賴受酸物乃肝藏止能養胎而虛也○胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類○胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱用四物湯加阿膠珠白木條芩縮砂炒香附炒黑加糯米白水煎服


○又方治胎漏下血

條芩五錢

白术一兩

砂仁炒

阿膠炒成珠



右爲細末每服二錢煎艾湯調服水煎服亦可。

○又方

枳殼炒

黃芩兩半

白朮一兩

水煎食前溫服

產

○胎痛宜用當歸地黃湯

當歸一錢

熟地黃二錢

右細切水一盞半煎至一盞溫服

產

○心腹諸痛凡姪婦偶有所傷腹痛不安或從高墜下重物所壓觸動胎元痛不可忍及下益者甚妙

砂仁不拘多少和皮畧炒勿令十分焦黑去皮取仁爲末熟酒調服不飲酒者米飲或艾湯鹽湯皆可調服如覺船中熱其胎即安矣此方即驗大抵姪婦不可缺此常服安胎易產

產凡妊娠二三箇月忽心腹疼痛不安用

當歸

三錢

阿膠炒

二

甘草炙

二

葱白

四根

右細切

分作二服

每服用水一盞煎至一小盞溫服

產

凡姪婦四五箇月忽心腹疼痛

大棗

十四枚

炒令黑鹽令赤

右爲末取一撮許酒調服之立愈

○治姪婦心腹大痛氣欲絕者

川芎

阿膠

二

芍藥

三

厚朴

各一兩

右細切

作一服

用水三升煎至一升分二服立飲而愈

產

○川芎散治婦素有冷氣冲心如刀刺者

上

飯生

桔梗

各四

枳殼

分

當歸

一錢

人參

製朴

五分

芍藥

七分

右細切

作二服


水一盞半煎至一盞稍熱服

醫學正傳

卷之十七

十一

十一



○妊娠腰痛如折不能轉側

鹿角

五錢

○治妊娠腰脚腫痛

踵一本作腫

白茯苓

杏仁

三錢去皮尖研

右以火燒令赤酒淬再燒再淬以碎為度細末酒調服

○胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬濕多或用山梔子一合炒為末米湯調下丸服亦可

○惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用一陳湯之類○又方以白朮為丸服一日肥人是熟

○半夏茯苓湯治惡阻不食吐逆頭眩四肢怠惰煩疼惡寒自汗

半夏湯炮七次瀆過宿姜汁拌炒黃色

生姜各一錢

茯苓七分

熟地黃 陳皮

桔梗

覆花無數

人參

芍藥


甘草

川芎各五分

右細切水煎空心服○千金方有紫蘇細辛各五分

○一婦孕兩月嘔吐頭眩鑿以參术川芎陳皮茯苓服之愈重脈弦左爲甚以惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又夾胎氣參术之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十四粒五服稍安脈畧數口苦乾食即口酸意其隔間滯氣未盡行以川芎陳皮梔子生姜茯苓煎湯下抑青丸十五粒愈後兩手脉平和而右甚弱其胎必墮此時肝氣既平可用參术以防之服一日而胎自墮矣

○參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶



方良

橘紅

茯苓
錢各一

麥門冬

白朮

厚朴
姜製

甘草
炙各五分

右細切作一服加生姜三片竹茹一錢或加入參一錢水一盞煎七分溫服

○小膠艾湯治姪婦因頓仆挫跌胎動不安或胎搶上逼心或腹痛血下

阿膠炒成珠
一兩 艾葉二兩 指迷方加秦艽一兩

右細末用水三升煎至一升半分三服

○膠艾湯不問月數淺深安胎極妙

熟地黃

艾葉

當歸

甘草炙

川芎

阿膠各五

黃芪二分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○治姪婦下血如月信來者若致胞乾非特損子亦能損母

熟地黃
乾姜炮各一兩

右細末每服二錢一日夜三四服

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水如豆

汁者

野苧根炒

金根各一
丙

右用冰酒各一盞煎至一盞去粗分作二服不拘時服

○胎動沖心煩悶欲死安胎止痛

當歸酒洗

川芎

人參

阿膠

右用冰酒七升煎至三升分三服

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水如豆

甘草各一兩


葱白切一升

右用冰酒七升煎至三升分三服

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水如豆

甘草各一兩

</



○姪娘因舉重仆跌損傷胎氣不妥或孕死腹中
產

川芎一兩

右為細末每服一匙連進三服死胎即下

○治姪娘遺尿失禁

白薇

白芍藥各等分

右為細末酒調方寸七日三服

○子煩姪娘苦煩悶不安又曰心煩熟悶謂之子煩

麥門冬

茯苓

防風

知母各一錢

右細切作二服用水二盞煎至一盞入竹瀝一二匙服

○星角散治子煩

犀角屑

地骨皮

條芩

麥門冬

赤茯苓各一錢炒五分

右細切作二服水一盞半煎至一盞入竹瀝一合溫服

○當歸飲治子煩

當歸半錢

川芎

阿膠珠

豆蔻

桑寄生各半錢白七莖

右細切作二服水一盞半煎至一盞溫服

○竹瀝湯治子煩

竹瀝一合

防風

黃芩

麥門冬各一錢

白茯苓半錢

防風

黃芩

麥門冬一錢

右細切作二服水一盞半煎至一盞去粗入竹瀝再煎數

沸溫服

○產寶澤瀉散治姪娘氣壅身熱腹脇浮腫喘急氣促小便閉
瀉不利謂之子滿

澤瀉


桑白皮

枳殼炒

桔梗

木通

赤茯苓各等分



寶產

右細切每服四錢加生姜五片水一盞煎八分溫服
金匱○張仲景曰婦人本肌肉肥盛頭舉自滿今反羸瘦頭舉中

隆胞系了戾亦多致此病但利水便即愈宜服督氣丸蓋藥中有茯苓故也地黃為君功在補胞

良方○木通散治姪娠身躰浮腫四肢脹急小便不利謂之子腫

木通一錢

木香

柯子皮各三錢

香薷一錢

枳殼炒五分

枳榔五分

桑白皮一錢

條芩五分

紫蘇莖葉一錢

右細切作二服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○全生白术散治姪娠面白虛浮肢躰腫脹名曰子腫

白术一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

茯苓各五錢

指迷方用伏苓皮多桑白皮無采

右爲細末每服二錢米飲調下

宝產○鯉魚湯治姪娠腹脹滿或通身浮腫小便不利或胎死腹中此方甚驗

當歸

白芍錢一

白茯苓一錢

白术二錢

橘紅五分

鯉魚拘尾不拘大小

右細切作二服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚肉汁一盞半生姜七片煎至一盞空心服當見胎水下如水去未盡或胎死腹中脹悶未除再合一劑服之水盡脹除為度

○紫蘇飲治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮

川芎

白芍

陳皮

紫蘇葉


當歸各六錢

人參

甘草各三分

右細切作二服加生姜三片葱五莖水煎服

○天仙藤散治姪娠三月成胎之後兩足自脚面漸腫至膝行步艱難喘悶妨食若水腫甚至足指間有黃水出者謂之



醫學正傳

卷之七

十三

子氣

天仙藤洗淨畧炒即
青木香藤也

甘艸

烏藥

香附子炒
木香各等分

陳皮

右細切每服三錢加生姜三片紫蘇五葉水煎日三服腫
消止藥

室產

○安榮散治妊娠小便澁少遂成淋瀝謂之子淋

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心艸

甘艸錢各五

人參

川芎各一兩

右爲細末每服二錢煎麥門冬湯調下○此方恐滑石太
重而滑胎若胎臨月可用若六七箇月已前俱不可輕用
宜矣此味或加梔子篇蓄石榆之類最穩瞿麥亦恐損胎
不可用也

驗

○地膚子湯治子淋小便澁數

地膚草

與芥菜相似
俗名白地苔

車前子

各一錢知母去毛炒
各三分

知母

去毛炒黃色
各七分

黃芩

赤茯苓

白芍

柏殼

炒黃色
各三分

升麻

通草

甘草

各三分

右細切

作二

一服水一盞半煎

至二盞溫服

○又方治子淋

地膚草四兩右以水四升煮取二升分三服或新取地膚
草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋閉服之無

不效驗


外○冬葵子散治子淋小腹疼痛胎動不安

冬葵子炒
柴胡去芦
桑白皮
赤芍藥

當歸各等分

赤芍藥

右細切每服四錢水一盞半加姜三片葱白七寸煎至二
盞去相溫服



○車前散治子淋或小便不通下焦有熱

枳榔

木通

陳皮去白

赤茯苓

車前子

赤芍

當歸

滑石

石葦炙去毛

右各等分每服五錢水一盞半煎至二盞溫服

外

○忘憂散治姪婦心經蘊熱小便赤澁不利淋瀝作痛

琥珀不拘

王多小

菖草根一握

右以琥珀研為細末每服五分濃煎服

方

○葛根湯治姪婦臨月忽發風瘡悶亂不省人事吐逆眩倒

少時醒後復發謂之子癟

貝母

葛根

牡丹皮

防己

當歸

川芎

桂心

防風

澤鴻各五錢

甘草各二分半

獨活

石膏

人參各一錢

右細切作二服水二盞煎至一盞溫服日三服其貝母令

久易產未臨月者以升麻代之忌菘菜

○防已湯治姪娘中風口禁四肢強直角弓反張

防已五錢

羌活一錢半

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸定去豆調藥末搗開口灌之稍醒再灌有効

○消風散治姪娘頭旋目眩視物不見頤煩腫核

石膏

煅

甘菊花去萼

防風去芦

荆芥穗

羌活


當歸酒浸洗

白芷各五分

甘草二分半

右為細末作一服加芽茶五分水一盞半煎至一盞食後

溫服



方局

○天門冬飲治姪娠外感風寒，冬嗽不已，謂之子嗽。
天門冬 紫苑茸 知母酒洗 桑白皮蜜炙各

五味子

桔梗去芦各五分

右細切作一服水一盞半煎至三盞，嗽血者加阿膠五分，大便澀者加苦亭歷子五分。

○百合散治姪娠咳嗽心煩，不欲飲食。

百合

紫苑茸 麥門冬 桔梗去芦

桑白皮

竹茹各一錢 甘州五分

右細切作一服水一盞半煎至三盞，入蜜半匙，再煎二三沸，去粗溫服。

○八味丸治姪娠小便不通，名曰轉胞。亦治子淋，此氣丸加桂心附子炮各

兩是也

○丹溪參术飲治姪娠轉胞。

四物湯加

人參 白朮 半夏湯泡透陳皮 甘州

右爲細末，加姜水煎服。

○丹溪曰：轉胞之証，胎婦之稟受弱者，憂悶多者，性急燥者，食味厚者，庸或有之。古方皆用滑利藥，鮮有應効。因思胞不自轉為胎所壓轉，在一邊，胞系了戾，不通耳。胎若舉起，居於其中，胞系自鍊，水道自利。夫胎之墜下，必有其由。吳宅寵人患此，兩手脉似濶，重按似弦，左稍和，予曰：此得之憂患，濶爲血少，氣多則胎氣弱，而不能舉弦，爲有飲血少，則胎弱氣多，有飲中焦不清而濶，則胞知所避而就下，乃以已上藥與服，隨以指探喉中，吐出藥汁，候少頃，氣定，又與乏，次早亦然，至八貼安，猶恐其法偶中後，又治數人，亦效。○安胎散治姪娠胎寒腹痛，胎熱多驚，舉動腰痛，腹滿，胞急卒，有所下，或因頓仆，閃肭或食毒物，或感冒時疾，寒熱往來，致傷胎藏，並皆治之。

方良

金匱


方局

升正

卷之十

升正

升正



寶產

方良

國醫家正傳

卷之十

七

川芎 枳殼麸炒黃各錢半 熟地黃三錢 糯米一合

右細切作二服水一盞半生姜三片大棗一枚更加金銀三五錢同煎至一盞溫服

○如聖散治姪娠腹痛胎動不安

鯉魚皮

當歸

熟地黃

阿膠炒成珠

白芍藥 川芎 川續斷酒浸 甘草炙各等分

右細切每服四錢水一盞半生姜三片苧麻根半錢許煎至一盞溫服○一方加乾姜竹茹無續斷

○加味四物湯治姪娠下血不止

本方加艾葉三十片

阿膠珠一錢

右細切每服四錢水一盞半加烏梅肉少許同煎至一盞熱服連進三四服即止

○苧根湯止血安胎

野苧炒兩 用酒水各一盞入金銀同煎至一盞溫服

○桑寄生散治姪娠下血不止胎動不安

桑寄生

川歸

川續斷

川芎

白朮

右細切作二服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○羚羊角散治姪娠中風頭項強直筋脈挛急言語蹇澀痰涎壅盛或時發搐不省人事謂之子癇

羚羊角

獨活

酸棗仁炒

五加皮各八分

蕤苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁各四分

木香

甘草各二分

右細切作二服加生姜三片水煎服

○歸涼散治姪娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等症

寶

歸涼散治姪娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等症



醫學正傳

卷之十七

川芎

苧根

白芍

麥門冬

甘草各半錢

糯米

荆芥穗

右細切作一服水一盞半煎至一盞入蜜一匙服
○白扁豆散治姪娠誤服草藥及諸般毒藥毒物，
白扁豆生去皮

右為細末清米飲調方寸匕神效

○芎藭補中湯養新血去瘀血補虛扶危，
阿膠珠

五味子

川芎

乾姜各四分黃芪蜜炙

川歸酒浸白术

杜仲炙

人參

甘草炙各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服後有一方名同，
多木香治小產，

○當歸芍藥湯治姪娠下痢赤白腹中疼痛，
白芍一錢當歸白茯苓澤瀉

白术條芩各半錢甘草

木香各三分

檳榔黃連

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如白痢腹痛甚者恐有寒也去芩連加乾姜三分，

○芎术香連丸治証同前

阿膠珠白术各五錢乳香

木香各二錢半


枳殼炒乾姜炮各二錢

黃連一兩茱萸同炒

砂仁炒

川芎各五錢

右為細末醋糊爲丸如梧桐子大每服三十丸白湯下
○治姪娠泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛由食瓜果生冷等物及當風取涼所致者，



柯子皮 煅

白术 各一錢 陳皮

良姜 炒

木香

白芍 酒炒

甘草炙各五分

肉荳蔻煨五分

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○芎蘇散治姪娠外感風寒渾身壯熱頭目眩運

紫蘇葉

川芎

白芍

白术

麥門冬

陳皮

乾葛各六分甘炒三分

右細切作一服加生姜五片葱白三寸水一盞半煎至一盞溫服不拘時候

方○升麻六物湯治姪娠六七箇月傷寒壯熱或發赤斑癩血

升麻 二錢 桑子

杏仁

大青草

小草

甘草各一錢

石膏各六錢

右細切作一服加葱白三寸水一盞半煎至一盞溫服人活○姪娠傷寒百節疼痛壯熱不急治即落胎

柴胡

乾葛

知母

石膏各六錢

大青八錢

梔子一兩 升麻八錢

石膏各六錢

右細切用

水七盞前至三盞半分四服

活○傷寒安胎

白术

黃芩 各等分新瓦上炒

柴胡一錢 前胡

當歸各七分人參四分

芍藥

生地黃各六分甘草三分

右細切作一服加生姜三片葱白三莖水一盞半煎至一

盞去粗溫服

症○催生散治姪娠傷寒熱病胎死腹中身冷唇青不能自出

蒼朮一錢 桔梗五分 橘紅三分 白芷

桔梗五分 橘紅三分

白芷

桂心 去皮

甘草 炙各半

當歸酒浸

乾姜 炮

厚朴

芍藥

半夏泡

川芎

枳殼 炒各半

南木香

杏仁 炒各一分

右細切作一服水一盞半加生姜三片大棗一枚煎至一盞溫服未下再進一服

○產治妊娠欬嗽

紫苑草

麥門冬 各半

一錢白皮

杏仁 炒去尖研

炙甘草 各二分

桔梗 二分

右細切加生姜三片竹茹一塊彈子大用冰一盞半煎至一盞去粗入白蜜一蛤殼許再煎數沸溫服

○產妊娠痰嗽見紅

歸身

熟地黃

天門冬

麥門冬

紫苑 各五分

桑白皮 蜜炙

杏仁

炙甘草

桔梗

片黃芩

五味子

阿膠 炒成珠

○小產後下血不止

右細切作一服痰盛加竹茹一團水煎入小薑汁同服

○小產後心腹疼痛

人參

黃芪

當歸

白朮

甘草 炙

阿膠 炒

白芍

艾葉

牡丹皮

砂仁

川芎

青皮

香附

熟地黃

白芍 各一錢

當歸

川芎

熟地黃

白芍 各一錢

玄胡索

七分

赤仁 去皮尖炒

紅花 各三錢

香附子

右細切水一盞半入童便酒各半盞煎至一盞溫服

青皮

炒黑

澤蘭

牡丹皮

各等分酒各半盞煎至一盞溫服

安榮湯


治胎氣不固時常小產

宜預服以固胎元

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄生

白朮

水煎服



產○治兒在腹中叫哭上

用多年空屋下鼠穴中土一塊，令姪婦噙之即止。

○又方用黃連三五錢濃煎汁時時呷下，自止。

云臍帶上疙瘩乃兒口中食者，因姪婦登高取物脫出

兒口以紙作聲令姪婦曲腰向地拾物使兒復得令安入口

中即止

○丹溪東胎丸至七八箇月內服之

黃芩炒夏一兩秋七錢冬五錢

白朮二兩

茯苓

七錢半

陳皮

三兩

右為細末粥丸如梧桐子大，每服三四十丸白湯下。

丹溪

○達生散孕至八九箇月內服十數貼甚好，易產腹少痛

大腹皮

原本三錢恐大多今用一錢先拭去酒洗

人參

陳皮

紫蘇

連莖葉各五分

白芍藥

白朮

當歸各一錢

甘草

炙二兩

右細切作一服外入黃楊腦七箇，食少胎瘦葱五葉夏加通枳殼砂仁，胎動不安加金銀三五錢野苧麻根一錢氣上逼心加紫蘇地黃性急加柴胡多怒或加黃芩佐之食少加砂仁神曲渴加麥門冬黃芩能食倍加黃楊腦
不長能瘦胎有痰加半夏黃芩

丹溪○臨月用以養胎方

當歸

川芎

黃芩

陳皮

白朮

香附各一錢白芷二分

甘草二分

右細切水煎調益元散一錢服虛者加入參七分


丹溪○催生散

白芷炒焦黑

百草霜

白滑石各等分

右為細末，前、後歸湯調下，二十三錢



丹溪○紅莧菜及馬齒莧俱能墮胎。姪婦切忌臨產用以催生煮食亦效。

丹溪○難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者亦有因八九箇月內不能謹慎者。

景仲○難產多見於安逸鬱悶之人富貴奉養之婦其貧賤者未之有也。古方瘦胎飲本爲湖陽公主設蓋以其奉養厚而氣實故爲此方以耗其氣使氣血和平而易產耳非至論也。

景仲○金匱當歸散安胎養血清熱孕婦時常宜服

當歸

川芎

芍藥

白朮

條芩各等分

右爲細末每服二錢溫酒或湯調服。

郎金液丸治橫生倒產。

飛生毛火燒腋下者尤佳 血餘無病女人髮燒灰

公母羊糞已上各半錢 伏龍肝一錢

黑鉛三錢半錢急攏繩成砂子傾出細研 用小鉛子火上鎔投水銀

右爲細末用粽子尖爲丸如菉豆大遇難產以順流水送下五丸兒身自順而正產子母俱活矣。

○催生鉛丹治橫生逆產。

黑鉛一錢

右以小鉛子大上鎔化投入水銀二錢急攏結成砂子傾出用熟綃紐作丸子如菉豆大臨時以香水送下立產。

○如神丹治難產用巴豆三枚草麻子七枚剝去研入射香少許捏作餅子貼臍。

詩曰巴三草七脫衣裳，細研如泥入射香，

捏作彈丸臍下貼。

湏臾子母便分張。

卷之二

○催生如聖散用黃蜀葵子不拘多少炒

右為細末，每服二錢，熟酒調下。如不飲酒，熟湯調亦可。或以蜀葵花培乾，熟酒調下，一錢亦效。

黃葵子炒去餘粒
若還臨危難產時

香桂散 下死胎
射香 五分
官桂 三钱為末

○來甦散治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事右件和勻作三服溫酒調下須臾即下

木香 不見火

黃酒
糯米半合

右細切作

醒再前二

辟靂奪命

藥救之

中州

右共為細
流水送下

子雞大昇

藥日進一
當歸酒洗

卷之三

卷之三

醒再前

窟窿者，
沃沫子母

尊教芝


髮灰 一錢

三
流水送下

二 糜子止血
○無憂散治

藥日進

甘草名至



右為細末分作二服水一盞煎至八分瀝去粗溫服不拘時候三異本無候字

○催生奪命如神丹
牡丹皮 枳壳 檀白 赤芍 各二錢 蛇退 二錢

青皮

阿膠珠

甘草炙

五加皮

馬鳴退 炙焦各五分

芸薹子

管衆

花蕊石

火煅五分乳香另研一錢

右為細末煉蜜丸如彈子大臨產細嚼一丸棗湯送下未產少墮又嚼一丸以產為度

○芎歸湯一名佛手散治妊娠因事跌仆子死腹中惡露妄行疼痛不已口噤欲絕用此藥採乏若子死腹中立便逐下若腹痛隨止子母俱安又治臨產難生胞衣不下及產後血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺疼痛

方良

血滯浮腫入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂死等証並皆治之

當歸

酒洗去苦一兩

川芎 七錢

右細切分作四服每服用水一盞煎水將乾投酒一盞者煎五七沸溫服如口噤擣開灌之如人行五里許再灌盡此四服便省立產神驗

○奪命丹治胞衣不下蓋兒之初生惡血流入衣中衣為益所張塞故不得下須臾冲上逼心即死急服此藥

黑附子

炮五錢

牡丹皮 一兩

乾漆炒烟五分研細

右為細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏和前藥末為丸如梧桐子大每服五七丸溫酒下

○黑龍丹治難產及胞衣不下血迷血暈等証

室產

卷之七

七

當歸

五靈脂

川芎

良姜

生地黃

紙筋鹽泥固濟火炒入后藥一兩硫黃

煅乳香各二錢琥珀

百草霜

石硫黃

花蕊石各一錢

右件連前藥共爲細末酒米糊爲丸如彈子大如用時將一二丸仍用火煅紅爲末以童子小便合酒調灌下垂死者灌三四丸即活其功不可盡述

產

○一方治胞衣不下

川牛膝二錢當歸一錢半

木通三錢

滑石四錢

黃葵子二錢半

右用承前連進三四服立下

方

枳殼散姪娠八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑胎易產安利子臟益血舒氣

枳殼

炒黃色

粉甘草

炙

一兩

香附子

炒

一兩

右爲細末每服二錢空心沸湯點服日進三服一方加糯米炒同爲末白湯點服令免易產初生胎氣微黑百日後肥白矣爲古方之冠若姪娠稍弱者單衣恐胎寒腹痛胎弱多驚於內加當歸一兩木香半兩不見矢如欲用之則陽不致強陰不致弱二氣調和有益胎嗣

○自姪娠初得以至臨月藥石禁忌歌

歌曰蛻班水蛭及蟻虫

烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆

牛膝薏苡連蜈蚣

二稜代赭荒花射

太戰蛇蠍黃雞雄

牙硝芒硝牡丹桂


槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草

瞿麥乾姜蟹甲瓜

硇砂乾漆蕪荑仁

地膽茅根莫角好




局○飲食禁忌

雞肉合糯米食令子生寸白虫○食尖肉令子無癩○鮑
鯉同雞子食令子生瘡痏瘡○食兔肉令子缺唇○食
羊肝令子多厄難○食鱉肉令子項短縮頭○鴨子與桑
椹同食令子倒生心寒○鮮魚同田雞食令子瘡瘻○雀
肉同豆醬食令子面生雀卵班熙○食螃蟹橫生○食姜
采令子多指○食冰漿令絕產○食水漿令絕產○豆醬令
無耻○食茨菰消胎氣○食驢馬肉過月難產○豆醬令
霍菜食墮胎○食山羊肉令子多病○食鰐鱠無鱗魚難
產○食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目○
勿妄服湯藥勿妄亂針灸勿過飲酒渠勿舉重登高陁險
心有大驚子必癱瘓勿多睡卧須時時少步動和血脉勿
勞力過傷使腎氣不足子必解顧腦破不合○衣母太溫

食母太飽若脾胃不和柴衡虛損子以羸瘦多病戒之戒
乏

鍼○臨產須知

- 一臨月不可洗頭以免橫生逆產
- 一懷娠十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏陷腰
間重脹穀道挺進漿水淋下其兒遂生此乃正產若當生
自有其時如瓜熟蒂懸栗熟自落之類
- 一凡臨產宜擇年高有識穩婆及純謹婦人三四人扶持
一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絕勿令觸犯
胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主傷害
- 一凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生
- 一歲月滿足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍亂卜
筮問神巫覲之流稱說鬼神多方哄嚇媒利產婦聞之恐



怖夫恐則氣怯氣性則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產如犯頭急宜服紫蘇飲以寬其氣

一凡臨月忽然腹痛或作或止或一日二日三五日胎水已來腹痛不正者名曰弄痛非當產也又有十一月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試月非當產也不問胎水來與不來俱不妨事但當寬心候時若果當產時腰腹痛極不已穀道挺逆眼中火出其時便產豈有或痛不痛欲產不產之候耶人多於此胡行亂做枉了性命可不慎歟

一凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且抹行熱忍若行不得則凭物而立行得又行

一世人不識但見腹痛總作便謂生產生婆竦往者不候時至便言試水試水併胞漿先破風入產戶以致腫脹門戶狹小乾澀難產

難產

一初覺不痛且當任意坐卧勉強飲食毋致胎產之

一凡產母初覺欲生便湏惜力調養不可妄亂用力兒身方轉便被用力一逼令兒錯路以致橫逆湏待臨到產門用

勿何益

一凡產母始覺心中憤悶可取白蜜一匙溫水調服

一產母如覺飢餓可進以軟白粥不令飢渴以致之力亦不可食硬飯糲粽恐產後有傷食之病

一未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲飲之為佳

一凡產不可服催生符水況血得寒即凝血一凝則胎滯而

反致難產夫催生符水蓋與野道士求食媒利之設有何益哉

一凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一二時後不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞內養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無力轉頭遲慢漿下即血來閉塞道路令子無路可通故難產也如用蜀葵子等破血之藥逐去惡血令兒得路而生故曰催生藥也

一凡催生多用滑利迅速之藥如

兔腦

筆頭灰

弩牙

蛇退之類是也

二凡催生若見水血先下于道乾澁不能下者如

猪脂

油

蜜

酒

葱白

滑石之類是也

○三凡催生若稽停勞力之外風冷乘虛入於子宮使氣血凝滯而難產者如

牛膝

葱

桂

五積散

順元散之類是也

○四凡催生有觸犯惡氣心煩燥悶難產者如

射香

硃砂

乳香

青竹茹之類是也

○夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道理臨事倉惶用力失宜遂有難產之危是故有逆產者則先露足有橫生者則先露手坐產者則先露其臀此皆用力太早之過夫當臍腹疼痛之初兒身總轉而未順用力一逼遂致橫逆若手足先露者用細針刺兒手足心一二分深三四刺之以盃塗其上輕上送入兒得痛驚轉一縮即順生之矣或兒脚先下者謂之踏蓮花生急以鹽金兒脚底又可急

○搔乏併以盐摩母腹上則正生矣

○灸法治難產及胞衣不下急於產母右脚小指尖頭上灸三壯炷如小麥大立產

○凡橫倒難產用蛇蛻一條全者蚕退紙一方右以二物入新甕瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯入乳香同調服下則順生

○又方治橫生先露手足

阿膠

火

滑石一兩

冬葵子一合

酥油一兩

每服四錢水一大盞煎至七分連進二三服

○又方治橫逆不順子死腹中用

伏龍肝灶心紅土也

右為細末溫酒調下一二錢其兒頭戴土而出甚驗

○礦產

凡兒身已順門戶俱正兒已露額而不能生此因兒身回轉肚帶攀住兒肩不能下也治法急令產母仰卧輕輕推兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其臍帶湏候兒身正順產母用刃一送兒即下生○又法令穩婆欬欬分開脐帶外將紙撫

○凡兒身向未順生路未正被產母用刃一逼令兒偏生或左腿或右腿或臂或左右額角雖兒身已逼產門而不能下但云兒已露額非頂也治法當令產母仰卧看生人輕輕推兒近上以手正其頭用刃一逼即下若是頭之後骨偏住桂異案文作桂穀道兒則露額當令首生入以綿衣炙令溫煖裹手急於穀道外傍輕輕推兒頭令正然後用刃一送兒即下生

○治盤腸產法

○有臨產則子腸先出甚可驚恐治法以益盛溫水溫潤其腸

此名偏產

此名偏產

令產母仰卧，且以言語安慰其心，却用好米醋半盞，和新汲水七分，攪勻，忽噀產母面或背，則打頓而收。每三噀，令一縮三噀，三縮，腸則盡收矣。合用參芪歸芍等大劑補藥，加升柴防風之類，以升舉之。未有不安者也。

○一方治產難數日子死，腹中不出，母氣欲絕。

瞿麥六兩

通草三兩

桂心三兩

牛膝四兩

榆白皮四兩，一方無榆白皮，有天花粉四兩，大能墮胎。右細切，用水九升煎取二升，去粗，分三服，頓飲即下。

○又一方牛膝丸，下死胎。

壯牛膝杜仲桂圓各三三兩

紫金藤七錢

肉桂二錢

當歸四錢

蜀葵根七錢

射香五分

右為朱米糊為丸，如梧桐子大，硃砂為衣。每服五十丸，乳

○又方治子死，腹中不出。

用黃牯牛屎，不拘多少，塗母腹上，立出。

○一云以牛屎炒令大熟，入醋半盞，以青布包裹於母臍，上下熨之，立下。

○又治子死，腹中用雞子黃一箇，生姜自然汁一丁，合調勻，頓服。

分免，後用芸薹粥補之。

○生子下血過多，子死，腹中增寒，手指甲青，面色黃黑，胎上搶心，悶亂，欲死。冷汗自出，喘滿不食，或食毒物，或誤服草藥，傷胎下血，不正胎尚未損，可安若已死，即下極妙。

牡丹皮

赤芍

桂心

菟仁

白茯苓

右各等分，為細末，煉蜜為丸，如彈子大，每服一丸，細嚼，淡醋湯送下，連服數丸，立驗。

○一方治胞衣不下

川牛膝三錢當歸身尾二錢木通三錢滑石四錢

冬葵子半錢


右細切水煎連進二三服即下

○丹溪活套

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治者証加減調治

○如覺腹中煩悶口苦厭食不開月數多少本方加白朮一條芩砂仁煎服○如五六箇月後胎動不安或逆搶逼心本方加阿膠艾葉砂仁枳殼條芩白朮野苧根入金銀同煎服○如氣血虛心煩脈虛大無力或怔忡并戰及時有微熱本方加入參白朮黃芩甘草酸棗仁遠志麥門冬地骨皮等藥○如五六箇月前無故下血或因事下血謂之漏胎本方加條芩白朮甘草白芷止夢根地榆桑寄生之類

○如七八箇月前後面目及四肢浮腫本方加茯苓澤瀉白朮條芩炒梔子厚朴甘草稍麥門冬之類○如孕中忽然口噤吐沫不省人事言語錯亂本方合二陳湯加麥門冬竹茹遠志石菖蒲之類○如感冒風寒頭痛發熱或身體疼痛本方合小柴胡湯或更加細辛白芷防風羌活等藥○如二三箇月內嘔吐惡心不納飲食謂之惡阻本方去地黃加陳皮半夏縮砂仁神曲藿香麥芽陳蒼朮白朮之類○或因事動胎致胎不安動撞不已及下血欲墮本方加入參白朮白茯苓條芩白芷桑寄生砂仁阿膠珠甘草等藥○或時有白濁白帶本方加白茯苓陳皮蒼朮半夏神曲牡蠣龍骨之類○如無故腹痛瀉利清水或發熱胎動不安本方加白朮茯苓猪苓澤瀉蒼朮柯子皮砂仁神曲乾姜之類



○祖傳經驗秘方治難產瀝胞乾胎不得下用香油蜂蜜各一碗和勻用銅鏃慢火煎一二沸掠去沫調白滑石末一兩重攪勻頓服外以油蜜於母腹臍上下摩之立產
○又方催生曾試甚驗用兔頭骨家猫頭骨各一箇烈火煅地上出火毒研為極細末每服二三錢濃煎芳歸湯調下即產

○又方治胞衣不下二退飲

蛇退二條全者 蚕退紙一方 蟬退 四十九箇
用蜜瓶盛燒存性細研順流水調服立下

論

婦人科 下產後

內經曰一息不運則機絀窮一毫不續則穹壞判所謂氣血周流循環無端少有不續則身危矣若夫妊娠之婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手折胞求路而出既出胞外母子分離呼吸殊息其可久羈於內而使慎氣化不運不續哉夫胎元壯健者胞既拆即隨衆而下故易產也其困弱者轉頭遲緩胞漿既乾汚血來塞道路凝滯是以橫生逆產子死腹中而產母之命死在須臾可不慎乎凡見將生之際胞漿既下踰時尚未分娩便當傍惶設計用藥逐去惡血使子路通暢而無難產之患豈可袖手以待斃哉是故催生之藥即芳歸益母草冬葵子之類皆使之遂去汚血者也若腰腹未甚痛

漿水少淋瀝而下名為試糲實非胞內真漿也且宜寬心守待切不可輕易便令穏婆接取產母用力逼胎太早多致橫逆不順切須謹慎其或先見手足不順者額偏露者但當以手輕輕撥正以待其自下可也若分娩之後胞衣未下者猶為可慎宜多方用藥逐下甚不可令粗率之婦摘取嘗貯有搣破尿脬致終身之害者有取下肝葉而產母隨時殞命者可不謹與若失難產之婦皆是產前恣慾所致非獨難產且產後諸疾皆由是而生焉或有乍寒乍熱似瘧非瘧或太熱頭疼肺痛如傷寒狀或卒中口禁如瘡如瘍或左癱右瘓角弓反張或妄言見鬼心神惶惑或耳目口鼻忽覺黑氣如烟薰之狀或腹中作痛綿綿不絕已上諸症若非惡露未盡即是勞傷血氣大虛之証丹溪曰凡產前當清熱養血為生產後宜大補氣血為要雖有雜証以未治乏此萬世不易之確

論也雖然亦有離蓐太早或潔浴身垢以致感冒風濕或啖雞子糬粽難消之物皆能惡寒發熱變証多端醫者宜潛心診察脉候以扶危拯急不可苟且妄治以不斬人之天下也

脈法

脈經曰新產婦人有三病一者病溼二者病鬱冒三者大便難云云師曰亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日而更發熱者尤為胃熱氣實淨氣湯主之婦入產後七八日無太陽症小腹堅痛尤為惡露不盡四五日

不木便趺陽，脉微實再倍其人發熱，日晡所煩燥者，譫語不能食利之即愈，宜承氣湯以熱在裏，結在膀胱也。

按丹溪曰產後宜大補血氣為主，雖有雜証以未治之又曰藥欲退產後之熱恐非至到可法之語姑述於此以與賢者共議而採擇之可也

丹溪曰產前脉細小，產後脉洪數皆死。又曰產前脉當洪數既產而洪數如故，豈得不死？此亦太槩言之。今見產後豈無脉洪數而生者？

方法 丹溪方法凡十一條

丹溪曰產後當大補氣血為主，雖有雜症以未治之。

○產後補虛用參木黃芪陳皮歸身尾川芎炙甘草，如發熱輕則加茯苓淡滲之，其熱自除重則加乾姜或云太熱而用乾姜何也？曰：「熱非有餘之邪熱，乃陰虛生內熱耳。蓋乾姜能入肺分利肺氣又能入肝分引衆藥生血，然必與補陰藥而

用之，妙造化之妙，非天下之至神其孰能與於此哉？」

○產後發熱惡寒或口眼喎斜等症皆是血氣虛甚，當以大補氣血為主治。左手脈不足，補血藥多於補氣藥；右手脈不足，補氣藥多於補血藥，切不可用小續命湯、表散之劑。


○產後惡寒發熱腹痛者當去惡血，若腹不滿者非惡血也。惡露不盡小腹作痛，名曰兒枕痛，用五靈脂香附為末，醋糊丸甚者加搗尖、桑仁，一云用神曲糊丸、白术陳皮湯下，氣虛者同。

四君子湯下。

○治益刺痛用當歸，乃和血之法。若因積血而刺痛者宜桑仁紅花當歸頭之類。血在下焦，當用歸尾。

○產後血運用韭菜細切盛於直嘴瓶中，以滾醋泛之急封瓶口，以瓶嘴納產婦鼻中，即甦。或用秤槌及磚石燒紅，投醋中薰之亦良法也。

○又方用鹿角一枝燒存性，火毒為末，酒調灌下即醒。



○血運因氣血俱虛痰火泛上，亦暈二陳導痰隨氣血加減，砂安神丸亦可服以麥門冬湯下。

○一方治血運

人參一兩 紫蘇五錢

右細切童便酒水三物同煎服

○嚴氏清龜散治產後血運，皆不知入

澤蘭葉

人參各一兩 荆芥穗四兩

甘草炙八錢

川芎二兩

右為細末每服二錢溫酒入童便調下，更用漆器燒烟薰之，頗置醋炭更服此藥。

○愈風湯治產後中風，口噤牙閼緊急，手足瘓癰角弓反張。

荆芥蕙

當歸各等分焙乾

右為細末每服三錢豆淋酒調下童便亦可。○豆淋酒用

大黑豆不拘多少炒焦，投好酒中。

丹溪○新產後不可用芍藥，以其酸寒，能伐發生之氣也。

局方○產後乳汁不通，用通草七分瞿麥柴胡天花粉各一錢，桔梗二錢青皮白芷木通赤芍連翹甘草各五分，作二貼水煎，食後細飲之，更摩乳房，或無子食乳者，要消乳，用麥芽二兩炒分作四服，白湯調下。

丹溪○產後泄瀉，利用陳皮白朮茯苓川芎酒炒芍藥黃芩滑石

炙甘草，煎服立効。○一方無甘草，有乾姜，按二物皆

丹溪○凡乳母但覺小水短少，即是病生，便湏服藥調治，蓋兒飲

母乳，母安，兒安，防患未形，治法之善者也。

丹溪○有產婦因收生，若不謹，損破尿脬，而致淋瀝不禁，因思肌肉破尚可完補，其脉虛甚，蓋難產因氣血虛故，產後猶虛，試與峻補，以參朮為主，芎歸為臣，菟仁陳皮黃芪茯苓

為佐以猪羊脬煎湯熬藥汁極飮之。一月而安。蓋氣血驟長其脬即完心稍遲亦難成功也。

方○黑神散治產後惡露不盡或胎衣不下血氣攻心腹疼痛及血迷血暉等症。

黑豆炒半升

熟地黃

當歸酒浸

肉桂去粗皮

乾姜炮

甘草炙

白芍

蒲黃各四兩

濟生方無蒲黃有附子

右為細末每服二錢童便和酒調服

產○人參當歸散治產後失血過多血虛則陰虛陰虛生內熱，

食入心煩短氣自汗頭痛

熟地黃

人參

當歸身

肉桂

麥門冬

白芍炒各一錢

右細切作一服入淡竹葉五片生姜三片水煎服

當歸黃芪湯治產後失血過多腰痛身熱自汗

當歸身三錢黃芪二錢

白芍一錢半炒

右細切作一服水一盞半加生姜三片煎至一盞溫服

○失笑散治產後心腹疼痛欲死及兒枕痛

蒲黃炒

五靈脂各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

產○三聖散治兒枕痛

當歸

肉桂

玄胡索各等分

右為細末每服二錢熟酒或童便調下

○抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

陳皮

右細切作一服入生姜二片水煎服之

人參各二錢

甘草炙一錢

右細切作一服入生姜二片水煎服之

○當歸羊肉湯治產後發熱，汗肢節疼痛日夕不愈，名曰褥勞。

當歸身 七錢 人參 七錢 黃芪 一兩 生姜 五錢

右細切用羯羊肉一斤，煮取清汁五大盞去肉粗，煎藥慢火煮取四盞分六服，徐徐飲之。

○茯苓散治產後心虛怔忡不定，言語錯亂。

人參

甘草

山藥

當歸各一錢

遠志 茯苓 桂心 麥門冬各五錢

右細切作二服，加生姜三片，大棗一枚，水一盞半煎至三盞去粗溫服。

○當歸散治產後氣血俱虛，恐增客熱，宜服此以去惡露。

當歸 白芍 川芎 黃芩各一兩

白朮 五錢

右為細末，每服二錢，童便入溫酒調下。

○黃芪湯治產後虛汗不止。

黃芪 二錢

白朮

防風

牡蠣粉 煅

白茯苓

麥門冬

炙甘草各五分

右細切作二服，加大棗一枚，水煎服。

○增損四物湯治產後陰虛發熱，或日間明了暮發寒熱。

當歸 川芎 生地黃 柴胡 各等分

右細切，每服五錢水一盞半煎至一盞，溫服。

○四物一黃散治產後腹中血塊作痛。


當歸 炒 川芎 熟地黃 白芍 炒各五錢

右為細末，每服二錢，空心溫酒調下。

○產寶黑龍丹治產後一切止疼垂死者，但灌藥得下無有不

蒲黃 炒半錢

右為細末，每服二錢，空心溫酒調下。



安者

生地黃

當歸

川芎

五靈脂

高良姜

各二錢

右細切用砂窩一箇盛藥外以赤石脂為細末醋調封縫又以紙筋蓋泥固濟文武火煅過置地上出火毒研細入

後藥

硫黃一錢半

花蕊石另研一錢

乳香另研一錢半

琥珀另研一錢

右同前藥共為細末醋糊為丸如彈子大每服一丸用生姜自然汁無灰酒各一合童便半盞合和將藥於炭火上燒紅投入姜酒內研散頓服立效

產○烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭目昏眩多汗無力及治崩中下血不止

麒麟竭

亂髮洗淨

松墨研醋淬

百草霜

當歸

肉桂

去粗皮赤芍

赤芍藥

鯉魚鱗

外燒存性

延胡索

右各等分為細末每服二錢溫酒調下

產○調經散治產後虛浮蓋敗血乘虛停積府藏流注肌肉腐壞成水令人面目四肢浮腫切不可用導水泄利之藥是謂重虛其虛多致夭亡此藥主之

沒藥一錢

琥珀另研一錢

桂心

赤芍藥

當歸各一錢

細辛

射香五分另研

右為細末每服一錢七羹汁溫酒童便和調服之

產○正脾散治產後通身浮腫及治婦人太病後脾氣虛弱中

滿腹脹等病

蓬莪术

香附子鹽便茴香


甘草炙

陳皮

卷之七

七

七



右各等分細末每服二錢火草木通湯下

良○柏子仁散治產後譫言妄語皆心血虧欠心神不守所致

柏子仁

遠志去心

人參去戶

桑寄生

防風去芦

琥珀另細研

當歸

熟地黃

甘草炙

右各等分細切每服五錢先用白羊心一枚而予煮汁二盞煎藥至一盞去羊心及粗溫服不拘時

施○琥珀散治產後癥血攻心迷悶妄言見鬼

琥珀

鐵粉各一錢

人參

茯神

生地黃

阿膠珠鐵半硃砂五錢

甘草

射香各一錢另研

右為細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

施○交感地黃煎丸治產後舌強不語眼見黑花或發狂見鬼

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸煎當歸湯化下食前服

方○七珍散治產後不語

人參

石菖蒲

川芎

熟地黃各一兩

細辛一錢

防風五錢去芦

右為細末每服一錢匕薄荷湯調下不拘時服

方○調中湯治產後漏利臍腹疼痛六脉沉細

高良姜

當歸


桂心

白芍

附子泡去皮川芎各一錢

甘草炙五分

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服



局○定痛散治產後惡血不止腹中作痛

當歸

芍藥各二錢 肉桂一錢

右細切作一服酒水合一盞半生姜五片煎至一盞服

○麻仁丸治產後大便秘結

麻仁去壳

枳殼

人參

大黃

當歸各八分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸白湯下未
通漸加丸數以便潤為度

局○羊肉湯治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及寒月中

生產

寒氣入於產門

臍下脹滿

手不可犯

此寒疝也此藥

主乏

之方乃張仲景

驗了

精羯羊肉

四兩當歸

二兩生姜

一兩陳皮

二兩

亦可

右細切用冰三碗酒一盞煎至一碗去粗分二服加葱鹽

局○滋腸五仁丸治產後血氣虛損太腸閉滯傳道難
杏仁去皮尖殼仁如上製柏子仁五錢松子仁二錢半
郁李仁一錢橘紅研末

右五仁另研爲膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如梧桐子

大每服三十丸加至五六十九食前清米飲下一方加當

歸梢五錢

局○固經丸治產後血氣未復而有房事及勞後損傷致血暴
崩或淋瀝不正

沒藥

赤石脂

補骨脂

木賊各半兩

附子一隻泡去皮臍

右為細末米糊爲丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下或

陳米飲下

○熟乾地黃散治症同前亦治婦人一切崩中下血不止頭目

腹堅脹兼治婦人室女經候不調赤白帶下腹脇疼痛

當歸去芦

赤芍各四兩

牡丹皮

桂心炒

延胡索炒各二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸或酒或米湯

任下

○猪腎子飲治產後蓐勞寒熱如瘧咳嗽頭疼自汗躄瘦腹中

疔痛

猪腰子切作四片當歸

白芍各一兩

右以當歸白芍二味細切用冰三碗煮至二碗去粗將腰子切碎如骰子狀入前藥汁內用晚粳米一合香豉一兩

葱白五七根同煮糜爛空腹食之日進十服

○當歸黃芪飲治產後陰脫

○謂陰戶宮中脫下

當歸白芍各二錢

當歸黃芪各二錢

右細切作一服水煎溫服未收再服

○當歸散治婦人陰脫又名疝癩

當歸

黃芩

白芍各一兩

牡蠣煅二兩

右為細末溫酒或米湯調下忌空腹重

○菟仁膏治產後陰疼煩悶

當歸研末拌付

菟仁五味子

桔梗

右為末溫酒或米湯調下忌空腹重

○硫黃湯治產後玉門不歟

當歸四兩吳茱萸

兔絲子各半蛇床子一兩


右細切每服四錢水一碗煎湯頻洗之自歟

○婦人乳汁不通有二種有血氣壅盛乳脉滯而不行者有血

酒李正傳

卷之七

六十一



氣虛弱乳汁絕少者，夫虛者補之用鍾乳粉、猪蹄、鯽魚之類，盛者行之用通草、漏芦、土瓜根之類，方見于後。

○漏蘆湯治婦人肥盛氣脈壅滯，乳汁不通或留結為壅腫痛，將欲成膿者，

漏芦二兩半蛇退炙一條土瓜根十根切片炒焦

按土瓜當作王瓜，禮記月令四月王瓜生即其物也其實如瓜萎而小如荔枝色黃藤蔓葉圓無缺者是

右為末每服二錢酒調下，仍吃熟羹湯助之。

○鍾乳散治婦人氣虛血少脉澁不行乳汁絕少，

鍾乳粉細研

每服二錢濃煎漏芦湯調下。


○母猪蹄湯治乳汁不通

母猪蹄一隻通草四兩

用冰一斗煮取四五升取汁飲之未下更作二料服之

○丹溪活套云

新產不可用芍藥，以其酸寒能伐發生之氣，內忌之只以黃芪四物湯為補虛之要藥，以黃芪湯芍藥是也。○如氣虛者本方加參术、茯苓、甘草、發熱者加乾姜。○自汗多者少用川芎，勿用茯苓倍蜜炙黃芪。○如口渴加五味子、麥門冬。○如腹痛者非芍藥不可，雖新產亦用，但以酒炒不妨。○如惡露不盡，作痛四物湯煎，調香附五靈脂末服甚者加茺蔚仁泥四五分。○新產子官未歛作痛名兒枕痛，又名瘕母塊痛，用醋炒芍藥粟殼甘草水煎入少米醋或以三物為末醋湯調服。酸以收之之義也。○產後有惡血不去，發寒熱成癥瘕者，四物湯加三稜莪术、乳香、沒藥香附五靈脂乾漆茺蔚仁紅藍花之類。○產後腹痛不息，宜四物湯加烏藥香附桂心高良姜陳皮，童便和醋煎服甚效。○產後月餘經血淋瀝不正，四物



加白芷升麻調血餘灰。○產後陰痛四物加藁本防風。○產後通身浮腫四物加乳香沒藥桂心木通大腹皮高良姜血竭枳榔海金沙。○產後子腸不收八物湯加升麻防風湏以酒炒黃芪為君。○產後中風口眼歪斜八物加附子荆芥少加防風羌活煎服。

京本校正醫學正傳卷之七終

